



Rectale zuigbiopsie



Bij een rectale zuigbiopsie haalt de arts enkele hele kleine stukjes darmslijmvlies weg voor onderzoek. De arts onderzoekt waardoor de klachten van uw kind zijn ontstaan en of er afwijkingen zijn.

Vorbereiding

Klyisma

Het is belangrijk dat het laatste gedeelte van de dikke darm (rectum) leeg is van ontlasting. U krijgt op de polikliniek een recept mee voor een mircolax/klyisma. Een uur voor uw vertrek van huis geeft u dit medicijn aan uw kind. Dit gaat het beste als uw kind op zijn linkerzij ligt. Probeer uw kind zoveel mogelijk te laten ontspannen en breng dan de tut (eventueel extra ingesmeerd met vaseline) in de anus en knijp de microlax/klyisma leeg. Het is belangrijk dat uw kind probeert het medicijn enkele minuten binnen te houden voordat hij naar de wc gaat.

Wat vertelt u uw kind?

Het is belangrijk dat u uw kind zo goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Uw kind kan zich zo voorbereiden op wat hem te wachten staat. U kunt uw kind vertellen dat hij:

- ongeveer 1 uur in het ziekenhuis moet blijven voor een onderzoek en dat u erbij blijft
- tijdens het onderzoek op de zij ligt met opgetrokken knieën en de dokter een klein rond kokertje in de anus brengt, net zoals een thermometer. En dat dit geen pijn doet.
- een half uur na het onderzoek met u mee naar huis mag

Opvang broertjes en zusjes

U kunt geen broertjes of zusjes meenemen naar het onderzoek om de kans op infecties en kinderziekten zo klein mogelijk te houden. Bovendien heeft uw kind tijdens de test al uw aandacht nodig. Door thuis voor goede opvang te zorgen, kunt u in alle rust bij uw kind zijn. U kunt ook gebruik maken van het Ronald McDonald Speeldek.

Over het onderzoek

Verloop van het onderzoek

Uw kind ligt op de zij op een behandeltafel, met opgetrokken knieën. De arts brengt een klein rond kokertje in de anus. In dit kokertje zit een heel klein mesje en een soort spuitje. Met het spuitje wordt een klein stukje slijmvlies in het kokertje gezogen dat vervolgens met het mesje wordt afgesneden. De arts doet dit ongeveer 4 keer. Het klinkt gevoelig, maar dat is het niet. Het voelt alleen koud aan. Het doet geen pijn, omdat de bovenste laag van het slijmvlies ongevoelig is. U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Na het onderzoek

Om de wondjes in de anus goed te laten genezen, mag u uw kind de eerste 3 dagen niet rectaal temperaturen en geen zetpillen geven.



Wanneer contact opnemen?

Het is mogelijk dat u na het onderzoek bloedspootjes aantreft in de ontlasting van uw kind. Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. De bloedspootjes zijn het gevolg van het wegnemen van de stukjes slijmvlies. Als u denkt dat het meer wordt of als uw kind koorts krijgt, belt u dan met het ziekenhuis.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek bespreken wij met u op het spreekuur. Maakt u hiervoor een aparte afspraak.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Contact

Dagbehandeling (010) 703 67 95 (bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur).



