



DDAVP-test

Bij volwassenen



U krijgt binnenkort een DDAVP-test. Hiermee testen we of het medicijn DDAVP bij u werkt. Hier vertellen we u over de test, de voorbereiding en bijwerkingen.

Over DDAVP

DDAVP is een medicijn voor patiënten met een stollingsziekte. Bijvoorbeeld de ziekte van Von Willebrand, een milde vorm van hemofilie A of een afwijking van de bloedplaatjes.

Het medicijn zorgt dat u tijdelijk meer stollingsfactoren in uw bloed heeft. Bijvoorbeeld factor VIII en de Von Willebrandfactor. Zo helpt het medicijn helpt om bloedingen te stoppen.

U leest meer over het medicijn in '[DDAVP](#)'.

Over de DDAVP-test

Van tevoren kunnen we niet voorspellen of het medicijn goed werkt bij u. Daarom doen we eerst een test.

Tijdens de test krijgt u het medicijn in het ziekenhuis. Voordat u het medicijn krijgt, meten we de hoeveelheid stollingsfactor in uw bloed. Ook nadat u het medicijn heeft gehad, meten we de hoeveelheid stollingsfactor in uw bloed. Zo zien we of het medicijn goed werkt bij u.

De test duurt in totaal 4 uur.

Vorbereiding

Kleding

Trek op de dag van de test kleding aan die makkelijk zit. Trek geen kleding met strakke mouwen aan.

Eten

U mag voor, tijdens en na de test gewoon eten.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Dan mag u deze gewoon innemen op de normale tijd. Behalve als de arts dit anders met u heeft besproken.



Verloop van de test

Voordat u het medicijn krijgt

1. We vragen u om naar het toilet te gaan en uit te plassen.
2. U gaat op een weegschaal staan. We hebben namelijk uw gewicht nodig om uit te rekenen hoeveel van het medicijn u nodig heeft.
3. U gaat zitten op een stoel.
4. U krijgt een infuusnaaldje in uw arm, in overleg met u. Via dit infuusnaaldje kunnen we bloed bij u afnemen.
5. U krijgt een bloeddrukmeter om uw arm.
6. We nemen wat bloed bij u af en meten uw bloeddruk.
7. Daarna krijgt u het medicijn via een prik in uw arm.

Nadat u het medicijn heeft gekregen

1. Het eerste half uur meten we elke 5 minuten uw bloeddruk.
2. Na 1 uur nemen we bloed bij u af via het infuusnaaldje. Daarna mag u de afdeling verlaten. U mag dan naar beneden.
3. Na 4 uur meld u zich bij de Centrale Bloedafname. Dit is in gebouw Ne. Daarna mag u naar huis

Weinig drinken

Tijdens de DDAVP test mag u pas wat water drinken als u geplast heeft.

In de 24 uur na de test mag u maximaal 1,5 liter drinken. U telt vanaf het moment dat u het medicijn kreeg. Dus kreeg u het medicijn om 13.00 uur, dan mag u tot 13.00 de volgende dag maximaal 1,5 liter drinken.

Waarom?

Het medicijn zorgt dat u meer vocht vasthoudt, en minder plast. Als u te veel drinkt, kunt u watervergiftiging krijgen.

Bijwerkingen en complicaties

Tijdens de test en een paar uur daarna kunt u last krijgen van deze bijwerkingen:

- een rood gezicht
- een warm of opgejaagd gevoel
- hoofdpijn en duizelig zijn
- vasthouden van vocht
- een lagere bloeddruk
- een snelle hartslag

Wanneer contact opnemen?

Neem contact op met ons als u thuis:

- onwel wordt
- zich erg ziek voelt



De uitslag

2 weken na de test neemt de hematoloog contact met u op, om de uitslag met u te bespreken. Als het nodig is, maken we dan een nieuwe afspraak.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Marjo Ortelee, Estienne Stehouwer-Burg en Kim van Leeuwen-Bouwhuis
(hemofilieverpleegkundigen):

- (010) 704 01 13 of 06 12 62 30 34. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.
- hemofilie@erasmusmc.nl

Bij spoed in het weekend of maandag t/m vrijdag in de avond:

- Spoedeisende hulp: (010) 704 01 45





